


# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR

- ”Terveillä” (ei merkittävää perussairautta) alle vuoden ikäisillä pojilla pissantulon häiriöt liittyvät usein rakennevikoihin: oireina huono virtaus, tulehdukset. Esinahan pullistuminen.
- Vaippaärsytys.



# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR

- Yli vuoden ikäisillä ongelmina ovat tulehdukset (esim. balaniitit) ja kutinat sekä esinahan pienet repeytymät. Adheesiot. Parafimoosi.



# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR

- **Esikouluiästä (>3v) alkaen tulevat yleisimmiksi oireiksi kutinat pippelissä, kirvely ja tiputtelu. Yökastelu voi uusiintua. Tiheävirtsaisuuttakin esiintyy jonkin verran. Balaniitteja alkaa ilmetä vähemmän. Aamujäykkyys saattaa hämmästyttää.**



# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR


- **Yli 5-vuotiaille balaniitit ovat harvinaisia, mutta tulevat uudelleen esiin puberteettivaiheessa. Uusina oireina tulevat iltapäiväkastelut (muuta tekemistä), pikapissaukset ja tiheävirtsaisuus. Tiukka esinahka (kiinnikkeet). Sosiaalinen ongelma korostuu kastelijoilla.**



# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR

- Puberteetista alkaen ilmenee myös uretriitteja ja spermavuotoa (ilman varsinaista ejakulaatiotakin).
- Tiheävirtaisuutta voi esiintyä, siitepölykaudet!
- Kivulias stondi on merkki liian ahtaasta esinahasta.



# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR

- Puberteetti.
- Yökastelua voi ilmetä satunnaisena, ilman selvää syytä tai eroottisiin uniin liittyen. Satunnainen, tilapäinen yökastelu 1-2x/kk on normaalia tässä iässä.



# Pojan pisuvaivat, SKNLY

## 251007 / MR

- Osa virtsausongelmista liittyy suolen toimintahäiriöihin, ADHD:hen, lääkityksiin (tyroksiini), diabetekseen. Kahvi, kokis, tee.
- Naurukastelu ilmenee jo leikki-iässä.
- Leikkausten jälkitilat. Masennus.

